

Nombre del producto	Acidos Carboxílicos		
Registro Sanitario No.	RSCO-002/I/03	Presentación:	5 L
Titular del registro	José Baldomero Cuéllar Cruz	Teléfono:	+52 (462) 621 6852
Descripción:	Los ácidos carboxílicos son moléculas que han sido ampliamente usadas como mejoradores de suelo y para quelatar minerales que son nutrientes en sus cultivos. Se trata de materiales que al ser aplicados junto con los elementos nutrientes mejoran la asimilación de estos, además de que repercuten en las propiedades físicas del suelo en donde mejoran su estructura y textura.		

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Composición Garantizada

Componentes	%
Acidos Carboxílicos	50.00 % P/P

Precauciones y advertencias de Uso:

- Use el equipo de protección adecuada para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto: Camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, cinturón y/o soporte lumbar, mascarilla desechable contra polvos, lentes protectores de plástico transparente y botas de hule o zapato cerrado, evite el contacto con los ojos y contacto prolongado con la piel.
- Después de manejar o aplicar el producto, báñese, cámbiese de ropa y lave ésta de volver a usarla.
- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.
- EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO.
- LA ROPA DE TRABAJO DEBERÁ SER LAVADA Y GUARDADA EN EL LUGAR DE TRABAJO.

Primeros Auxilios

En caso de sobre exposición;

1. Retire a la persona de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto,
2. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele de ropa;
3. Manténgala bien abrigada y en reposo.

En caso de inhalación:

1. Retire al individuo hacia un lugar fresco y ventilado.
2. Si el producto cayó en los ojos; lavar con abundante agua limpia al menos 15 minutos, consulte a su médico.
3. En caso de ingestión accidental enjuague bien la boca sin deglutir. Consulte a su médico.
4. Si cayó en la piel lávese con abundante agua limpia y jabón.

Medidas de Protección al ambiente

RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO.

MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD.

RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.

NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA.

NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA.

RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO.

REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

Aviso de Privacidad:

Esta empresa responde por la composición garantizada correcta y el contenido neto, sin embargo, no se hace responsable por el mal uso del producto ni por los daños que puedan causarse en caso de no cumplir con las recomendaciones señaladas en esta etiqueta.

Métodos para reparar y aplicar el producto:

Este producto se aplica al follaje mediante aspersión, llenar hasta la mitad el tanque de mezclado, abrir el envase quitando la tapa y romper el sello de seguridad, medir la cantidad a utilizar y vaciar el producto medido al tanque de mezclado procurando no entrar en contacto con el producto, agitar hasta lograr uniformidad en la mezcla y finalmente llene el tanque. Realice las aspersiones mediante equipo de aplicación manual, de motor, montado al tractor o con el equipo de aplicación aérea procurando un completo mojado del follaje del cultivo.

Procure exactitud en sus dosificaciones y siempre calibre su equipo de aplicación. Las aplicaciones en drench deben realizarse mojando perfectamente el suelo de suficiente agua para un buen cubrimiento del mismo.

Recomendaciones de uso

Cultivo	L/Ha	Época de Aplicación
Maíz, sorgo, trigo, cebada, frijol, alfalfa.	10-20	Aplicar en el primer riego y repetir en el siguiente riego
Naranja, limón, Toronja	5-10	Aplicar en primer riego en desarrollo vegetativo y repetir dos aplicaciones más en los siguientes riegos
Clavel, rosal, gladiola, crisantemo	2-5	Aplicaren el primer riego y repetir en los siguientes riegos dos aplicaciones más.
Fresa, frambuesa, zarzamora	3-5	Aplicar en el primer riego y repetir en cada riego que se realice al cultivo
Sandía, melón, pepino y calabaza	5-10	Aplicar a los 15 días del trasplante y repetir en cada riego
Tomate, chile, Papa y berenjena	5-10	Aplicar luego del trasplante y repetir en cada riego.
Brócoli, coliflor y lechuga	5-10	Aplicar a los 15 días del trasplante y repetir en cada riego
Guayabo, papayo, manzana, piña y aguacate	5-10	Aplicar en pleno crecimiento y cuando se requiera